




BASATA



5. Upotreba Algicida

Razblažiti potrebnu količinu u nekoliko litara vode i ravnomerno je prosipati po celoj površini bazena. Doziranje:

Početno je 1 litar na 100 m3 vode

Redovno održavanje je 2 dl. na 100 m3 vode jednom nedeljno

Važno: Nikada ne koristiti algicid u isto vreme kada i hlor za šok tretman. (min 48 sati nakon šok hlor tretmana)

Kupanje dozvoliti sutradan po obavljenom šok tretiranju vode. Držite Algicid dobro zatvoren. U slučaju kontakta sa očima ili kožom isprati odmah.

6. Flokulant

Da bi se dobila što bolja t.j. kristalnija bistrina vode koristi se flokulant koagulaciono sredstvo flokulant vezuje sitne čestice u veće, koje se pri sledećem ciklusu zadržavaju u filteru.

Doziranje: 1 vrećica na 40-50 m3 vode na svakih 15-20 dana.

7. Uporedna tabela za primenu hemijskih sredstava

Pre hemijskog postupka iz tabele obavezno proveriti pH vrednost vode u bazenu i po potrebi je korigovati primenom "pH -" odnosno "pH +" stabilizatora (vidi "Uputstvo za održavanje")

ZAPREMINA BAZENA	ŠOK HLOR	TRIPLEX (tablete 200gr)	ALGICID
10 m3	150 gr	1/2 tablete	0.1 litra
20 m3	300 gr	1 tableta	0.2 litra
40 m3	600 gr	1 1/2 tablete	0.4 litra
60 m3	900 gr	2 tablete	0.6 litra
80 m3	1200 gr	2 1/2 tablete	0.8 litra
100 m3	1500 gr	3 tablete	1 litar
120 m3	1800 gr	4 tablete	1.2 litra
Učestalost tretmana	mesečno	nedeljno (5-7 dana)	nedeljno

* Ukoliko je zapremina Vašeg bazena veća količina hemijskih sredstava odredite prostom proporcijom u odnosu na date.

Napomene: Za redovno održavanje, poželjno je algicid dodavati na svakih sedam dana od dana startnog tretmana, ali u količini 4 puta manjoj od tabelarne količine za startni tretman. Vrednosti iz tabele važe za startni tretman i redovno održavanje bazena tokom sezone. U svim drugim slučajevima (vansezona, zapuštenost, itd.) pogledati "Uputstvo za održavanje" ili se obratiti stručnom licu ("BASATA", Beograd, Dobračina 59b. Ili na tel. 011/2634-378; 634-934; i mob. 063/339-529; 064/13-888-15).

